

LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD



2 45 0489 7397

LANE MEDICAL LIBRARY
300 PASTOR DRIVE
PALO ALTO, CALIFORNIA 94304

LEWIS MEDICAL LIBRARY
300 PASTEUR DRIVE
PALO ALTO, CALIFORNIA 94304



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40154018_0162

H. v. Meyer
J. Fr. Dr.
Dorpat
1886
Lane Medical Library

Ueber eine neue Eigenschaft
der Producte der regressiven Metamorphose
der Eiweisskörper.

Von

August Nauck.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.
1886.

Ueber eine neue Eigenschaft
der Producte der regressiven Metamorphose
der Eiweisskörper.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserl
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

August Nauck.

Ordentliche Opponenten:

Doc. Dr. K. Dehio. — Prof. Dr. F. A. Hoffmann. — Prof. Dr. A. Schmidt.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1886.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Referent: Professor A. Schmidt.

Dorpat, den 8. Februar 1886.

Nr. 44

Decan: Raehlmann.

Meinen Eltern

IN LIEBE UND DANKBARKEIT

gewidmet.

Indem ich vorliegende Arbeit der Oeffentlichkeit übergebe, sage ich allen meinen Lehrern an hiesiger Hochschule für die wissenschaftliche Ausbildung, welche sie mir während meiner Studienzeit geboten, den aufrichtigsten Dank.

Herrn Prof. Dr. Alexander Schmidt, dessen Assistent zu sein ich die Ehre habe und der mich bei meinen Untersuchungen in liebenswürdigster Weise unterstützt hat, bitte ich meinen herzlichen und warmempfundenen Dank entgegennehmen zu wollen.

I.

J. v. Samson-Himmelstjerna ¹⁾ gelangte bei feinen Untersuchungen betreffend den Einfluß der Producte der regressiven Metamorphose der Eiweißkörper auf die Gerinnung zu folgenden Resultaten: Die Versuche mit filtrirtem Plasma waren zunächst wenig ermunternd; das eine Mal fand allerdings eine Beschleunigung der Gerinnung durch diese Stoffe statt, das andere Mal verhielten sich dieselben dagegen, trotz sonst ganz gleicher Bedingungen, indifferent oder wirkten gar hemmend; auch die sich hieran knüpfenden Fermentbestimmungen ergaben wenig Positives. Schon bessere Resultate erzielte v. Samson, indem er statt des filtrirten Plasma sog. Plasminlösungen benutzte; aber auch hier erhielt er, wenngleich feltener, negative Resultate. Noch günstiger fielen die Resultate aus, als v. Samson mit 1 % filtrirten, an sich entweder gar nicht oder nur sehr langsam gerinnenden, Gallensalzplasmalösungen arbeitete; hier war stets eine Hervorrufung resp. Beschleunigung der Gerinnung durch die Producte der regressiven Metamorphose der Eiweißkörper, die ich in Folgendem der Kürze halber als Extractivstoffe bezeichnen werde, zu constatiren, und auch die Ferment-

1) J. v. Samson-Himmelstjerna. Ueber leukämisches Blut nebst Beobachtungen betreffend die Entstehung des Fibrinfermentes. Inaug. Diss. Dorpat 1885. pag. 33 ff.

bestimmung ergab stets eine Vermehrung desselben in Folge des Zusatzes dieser Stoffe.

Die Zusätze, welche übrigens meist nicht gewogen sondern nach Augenmaafs bestimmt wurden, waren in Relation zu den Plasmaproben (à 3 Ccm.) sehr klein und bewegten sich in den Grenzen der Milligramme.

Der Harnstoff nahm bei allen Versuchen eine Sonderstellung ein insofern, als er sich stets vollkommen indifferent verhielt.

Das Verhalten der stickstoffhaltigen Extractivstoffe zur Gerinnung genauer zu prüfen und womöglich zu ermitteln ob jene Stoffe selbst wahre, unmittelbare Mutterstoffe des Fibrinfermentes darstellen, war der nächste Zweck der von mir angestellten Versuche.

Da v. Samson bereits gefunden, daß die Extractivstoffe auf das Gallensalzplasma am sichersten einwirken, so stellte ich meine Versuche von vornherein mit diesen Lösungen an.

Was zunächst die Wirkung der Gallensalze auf Plasma betrifft, so kann ich die von v. Samson gemachten Erfahrungen im Wesentlichen bestätigen. Glycocholsaures sowohl als taurocholsaures Natron hemmen die Gerinnung des Plasma meist vollständig, wenn man aus dem unfiltrirten Plasma 2 % ige, aus dem filtrirten, leukocytenfreien, 1 % ige Gallensalzplasmalösungen herstellt. Die unfiltrirten Gallensalzplasmalösungen klären sich nach kurzer Zeit durch Auflösen der Leukocyten auf; es tritt in ihnen jedoch, selbst wenn sie in Eiswasser aufbewahrt werden, bereits nach ca. 24 Stunden eine anfangs feinflockige Trübung auf, die sich später zu etwas größeren, schleimigen Klumpen zusammenballt, ohne daß jedoch ein zusammenhängendes Gerinnsel gebildet wird. Bei sehr grofser Tendenz des Blutplasma

zu gerinnen sind gröfsere Zusätze von Gallenfalz, als soeben angegeben worden, erforderlich, um dasselbe permanent flüssig zu erhalten.

Das glycocholsaure Salz wirkt nur etwas intensiver als das taurocholsaure, sonst jedoch vollkommen identisch. Da im hiesigen Institute eine gröfsere Menge taurocholsauren Natrons vorrätig war, so habe ich alle meine späteren Versuche mit diesem Salz angestellt.

Das Gallenfalz verzögert zunächst die Entstehung des Fibrinfermentes; so bestimmte ich den Fermentgehalt einer 1%igen, filtrirten, permanent flüssigen Gallenfalzplasmalösung, welche ich, um ihr Zeit zur Fermententwicklung zu geben, erst 24 Stunden nach der Herstellung des Präparates unter Alcohol gebracht hatte, und erhielt 0,1 Fermenteinheiten¹⁾; eine von derselben Lösung nach 2 Mal 24 Stunden unter Alcohol gebrachte Probe ergab nur 0,3 Fermenteinheiten. Diese fast gänzliche Unterdrückung der Fermententwicklung im Plasma durch das Gallenfalz habe ich mehrfach sowohl am filtrirten als am unfiltrirten Plasma constatirt.

Immerhin fand aber doch eine, wenn auch höchst geringe, Fermententwicklung trotz der Gegenwart des Gallenfalzes statt, und man könnte es deshalb auffallend finden, dafs das letztere die Gerinnung des Plasma geradezu ganz aufzuheben vermag. Dieses erklärt sich aus dem Umstande, dafs das Gallenfalz eben nicht blofs die Fermententwicklung, sondern, wie der sogleich zu erwähnende Versuch zeigen wird, auch die Wirkung des freien Fermentes, die Fermentation, hemmend beeinflusst, wenn auch in geringerem Grade als den Vorgang der Fermententwicklung selbst.

1) Die Fermentbestimmungen habe ich nach der bekannten Methode mit dem Schmidt'schen Salzplasma gemacht.

Zur Begründung dieser Angabe führe ich den folgenden Versuch an. 100 Ccm. gekühltes Plasma wurden mit 1500 Ccm. eiskaltem Wasser verdünnt und Kohlensäure zur Fällung des globulinartigen Gerinnungssubstrates durchgeleitet. Nachdem der Niederschlag sich gebildet, wurde er durch mehrfaches Decantiren mit großen Mengen eiskaltem Wasser gereinigt und schließlich in 100 Ccm. Wasser unter tropfenweisem Zusatz von höchst verdünnter Natronlauge und unter häufigem Schütteln bis zur Entstehung einer durchsichtigen, opalisirenden Flüssigkeit gelöst. Die völlige Klärung der Flüssigkeit herbeizuführen ist nicht rathsam, weil hierzu größere, in Bezug auf den Gerinnungsvorgang überschüssige Natronmengen erforderlich sind, welche ihrerseits entweder alle Stadien der Gerinnung hemmend beeinflussen, so daß ihnen nur durch sehr große Fermentzusätze entgegengewirkt werden kann, oder sogar, da unter solchen Umständen alle Proceßse sehr langsam verlaufen, die Zeit gewinnen können, um das Gerinnungssubstrat in Alkalialbuminat umzuwandeln, womit der Versuch vollständig verdorben ist. — Eine solche aus dem Blutplasma gewonnene Globulinlösung gerinnt sich selbst überlassen nicht, weil ihr mit der Entfernung des Plasma die Unmöglichkeit genommen ist Ferment abzuspalten. Bei Zusatz von Fibrinferment findet zwar die fermentative Umwandlung statt, aber das Fermentationsproduct scheidet sich, wie bekannt, wegen fast gänzlicher Beseitigung der Plasmasalze durch die vorangegangene Behandlung entweder garnicht oder erst nach Verbrauch sehr langer Zeiträume aus; die Lösung bleibt also trotz des Zusatzes von Ferment flüssig, aber man erkennt an einer Probe derselben den Zeitpunkt der beendeten Fermentation daran, daß die Faserstoffausscheidung bei Zusatz von einem Tropfen Kochsalzlösung sofort eintritt.

Es galt nun zu bestimmen, ob und in welchem Maasse der Fermentationsvorgang, welcher die Gegenwart von freiem Ferment voraussetzt, vom Gallensalz beeinflusst wird. Zu dem Zwecke setzte ich zu 50 Ccm. jener Lösung des Gerinnungssubstrates 25 Ccm. einer dünnen Fermentlösung, vertheilte die Flüssigkeit sodann auf 5 Reagensgläser à 15 Ccm. und fügte sofort entsprechende Quantitäten von taurocholaurem Natron hinzu, so daß sich eine $\frac{1}{2}$ % ige, 1 % ige, $1\frac{1}{2}$ % ige und 2 % ige Lösung erhielt; die letzte Probe blieb zur Controlle unversetzt. Von diesen Lösungen nahm ich von Zeit zu Zeit Proben zu je 1 Ccm. ab und versetzte dieselben mit 1—2 Tropfen einer 10 % Kochsalzlösung; war die Fermentation bereits vor sich gegangen, so trat bei Salzzusatz momentan die Faserstoffausscheidung ein. Ich fand nun, daß in dem Controllepräparate und in der $\frac{1}{2}$ % igen Lösung die Fermentation fast gleiche Zeiten in Anspruch genommen hatte, d. h. ca. 30 Minuten; in der 1 % igen Lösung dauerte der Vorgang ca. 6 Stunden, in der $1\frac{1}{2}$ % igen Lösung ca. 14 Stunden und in der 2 % igen Lösung war die Fermentation innerhalb 24 Stunden noch nicht vor sich gegangen.

Man sieht hieraus, daß die Fermentation durch Gallensalzmengen, welche das normale Blutplasma permanent flüssig erhalten, zwar bedeutend verzögert, aber durchaus nicht ganz aufgehoben wird; ein Zusatz von $\frac{1}{2}$ % Gallensalz erwies sich hier sogar als ganz unwirksam. Wenn aber im permanent flüssigen Gallensalzplasma die Fermentation, ob langsamer oder rascher, vor sich ginge, so würde sich ihr, wegen des natürlichen Salzgehaltes des Plasma, auch die Faserstoffausscheidung anschließen¹⁾ und von einem permanenten Flüssigbleiben könnte

1) Weil wie wir soeben gesehen haben, die coagulirende Wirkung der Salze auf das Fermentationsprodukt durch das Gallensalz nicht aufgehoben wird.

keine Rede sein. Das Wesentliche der Wirkung des Gallensalzes auf das Blutplasma beruht also nicht sowohl in einer Hemmung der Fermentation, als vielmehr darin, daß dieselbe garnicht zu Stande kommt, indem das Gallensalz die Spaltungsprocesse, welchen das Fibrin ferment seine Entstehung verdankt, fast ganz unterdrückt.

Hat demnach vor Zusatz des Gallensalzes die Fermententwicklung und die mit ihr Hand in Hand gehende Fermentation im filtrirten oder unfiltrirten Plasma bereits begonnen, was bekanntlich beim gekühlten Plasma allmähig vor sich geht, so wirkt das Gallensalz um so schwächer je später dasselbe zum Plasma hinzugefügt worden, d. h. zur absoluten Gerinnungshemmung sind entsprechend größere Zusätze an Gallensalz erforderlich.

Hat dagegen der fermentative Umwandlungsproceß sich bereits vollständig ausgebildet, so daß die Flüssigkeit unmittelbar vor dem Moment der Faserstoffausscheidung steht, so ist ein Zusatz von Gallensalz auf die Gerinnung von gar keinem Einfluß; v. Samson hat dieses bereits nachgewiesen und die Methode der Untersuchung genau beschrieben ¹⁾.

Durch Wasser, Kohlenäure und Zellenzusatz zum Gallensalzplasma kann man die Wirkung des Gallensalzes sehr stark abschwächen resp. vollständig aufheben. Um die Wirkung von Wasserzusatz zu demonstrieren, führe ich folgendes Beispiel aus meinen Versuchsprotokollen an: 6 Ccm. 1 % filtrirtes Gallensalzplasma wurden in 6 Reagensgläser à 1 Ccm. vertheilt; die erste Probe blieb ohne Wasserzusatz, zu den andern fügte ich 1, 2, 3, 4 und 5 Tropfen Wasser hinzu. Während nun die unverdünnte Probe nach ca. 48

1) l. c. pag. 41 und 42.

Stunden gerann, trat in den übrigen die Gerinnung nach ca. 24, 12, 8, $3\frac{1}{2}$ und $2\frac{1}{2}$ Stunden ein. Das reine filtrirte Plasma von dieser Blutprobe gerann in $2\frac{1}{2}$ Stunden ¹⁾, wie das mit 5 Tropfen Wasser ersetzte Gallensalzplasma. Demnach war durch den Zusatz von 5 Tropfen Wasser zu 1 Ccm. 1 % filtrirtes Plasma die Wirkung des Gallensalzes vollkommen aufgehoben, was übrigens eben nur für dieses Plasma gilt. Es besaß eben das Plasma in diesem Falle eine sehr bedeutende Gerinnungsenergie, wie auch schon daraus ersichtlich, daß die unverdünnte gallensalzhaltige Probe schon in ca. 48 Stunden gerann, während 1 % filtrirtes Gallensalzplasma, wenn es keinen Wasserzusatzen erhalten, fast immer permanent flüssig bleibt. Ich will bei dieser Gelegenheit nur constatiren, daß man durch entsprechenden Wasserzusatzen den Einfluß des Gallensalzes stets vollständig paralisiren kann.

In Betreff der Kohlenäure muß ich hervorheben, daß ein Zuviel derselben schädlich, d. h. nicht sowohl gerinnungsbefördernd als vielmehr gerinnungshemmend auf das Gallensalzplasma wirkte, und zwar mußte die Menge der Kohlenäure in umgekehrtem Verhältnisse zur Gerinnungstendenz der Flüssigkeit stehen.

Auch der Zusatz von Lymphdrüsenzellen paralisirte die Wirkung des Gallensalzes, wovon es sich leicht erklärt, warum beim unfiltrirten Plasma 2 % Gallensalz erforderlich sind zur absoluten Gerinnungshemmung, während beim filtrirten Plasma bereits 1 % ausreicht.

Ich gehe nun über zu der Beschreibung meiner Versuche mit den Producten der regressiven Metamorphose der Eiweißkörper. Von den letzteren habe ich geprüft: Glycin,

1) Anm. Ich will gleich hier bemerken, daß ich stets den Moment der vollkommen beendeten Gerinnung notirte, d. h. wenn sich die Flüssigkeit in ein dem Glase anhaftendes Coagulum verwandelt hatte.

Taurin, Leucin, Tyrosin, Kreatin, Guanin, Xanthin, Hypoxanthin, Sarkin, Lecithin ¹⁾, Harnsäure und Harnstoff. Sämmtliche Präparate waren von Dr. Grübler in Leipzig bezogen worden.

Voraus schicken will ich gleich hier, daß sich sämmtliche Stoffe bis auf den Harnstoff in ihrer qualitativen Wirkung vollkommen gleich verhielten; nur der letztere bildete, wie auch schon v. Samson fand, eine Ausnahme und wird daher bei der Beschreibung später besonders berücksichtigt werden.

Zunächst prüfte ich die Wirkung der Extractivstoffe auf unfiltrirtes Plasma mit 1½ und 2 % Gallensalz. v. Samson hatte dieses aus Mangel an Zeit unterlassen. Ich habe mit den unfiltrirten Gallensalzplasmalösungen relativ wenige Versuche angestellt und meist mit nicht gewogenen, sondern nach Augenmaass bestimmten Zusätzen. Die unverdünnten 1½ und 2 %-igen Gallensalzplasmalösungen gerannen nun meist weder spontan, noch nach Zusatz der Extractivstoffe. Die anfangs klare Flüssigkeit wurde trübe, es bildeten sich in ca. 24 Stunden die oben beschriebenen Flocken, vielleicht in größeren Mengen in den mit den Zusätzen versehenen Präparaten; es kam jedoch zu keiner ausgesprochenen Faserstoffausscheidung, wenigstens nicht in den von mir angewandten Beobachtungszeiten. Dagegen fand ich, daß bei einer Verdünnung des Gallensalzplasma mit gleichen Theilen Wasser, wodurch ihre Gerinnungstendenz wieder wachgerufen wird, die Extractivstoffe stets stark beschleunigend auf die Gerinnung wirkten; bei einer Verdünnung mit 2 Theilen Wasser aber, wodurch die Wirkung des Gallensalzes mehr

1) Dasselbe wurde vor dem Versuch durch Verreiben mit verdünnter Natronlauge neutralisirt.

oder weniger vollständig paralyfirt wird, trat ein Umschlag in der Wirkung der Extractivstoffe ein, d. h. dieselben Mengen dieser Stoffe wirkten jetzt nicht mehr beschleunigend, sondern hemmend ein, und um eine Beschleunigung herbeizuführen, mußten sie in viel kleineren Mengen angewendet werden. Ein Ueberschuß dieser Stoffe wirkte also wieder gerinnungshemmend, und das Optimum des Zusatzes war um so kleiner, je stärker mit Wasser das Gallensalzplasma verdünnt worden war. Bis zu der durch dieses Optimum bezeichneten Grenze aber, mochte sie höher oder tiefer liegen, wuchs die Beschleunigung der Gerinnung in geradem Verhältnisse mit der Gröfse des Zusatzes.

Gleich bei den ersten Versuchen bemerkte ich, dafs die fragliche Wirkung der stickstoffhaltigen Extractivstoffe nicht blofs von ihrer Quantität abhängt, sondern in höchstem Grade auch von der Gerinnungstendenz meiner Plasmapräparate, so zwar, dafs um so kleinere Mengen der ersteren bereits als überschüssige (also gerinnungshemmend) wirkten, je bedeutender die Gerinnungstendenz war.

Man kann sich auch folgendermaafsen ausdrücken: ist die Gerinnungstendenz des Plasma ganz unterdrückt, d. h. ist sie $= 0$, so sind die Extractivstoffe ganz ohne Wirkung, resp. das Optimum derselben liegt unendlich hoch. Von der Grenze 0 an aber, mit wachsender Gerinnungstendenz des Plasma, sinkt das Optimum der Extractivstoffe bis dasselbe bei gewissermaafsen unendlich grofser Gerinnungstendenz 0 wird, so dafs nun jede, auch die kleinstdenkbare Quantität dieser Extractivstoffe als überschüssige wirken würde.

Die Gerinnungstendenz ist aber ihrerseits abhängig zunächst von der Natur des zum Versuch benutzten Plasma; sie wird hemmend beeinflusst durch das hinzugesetzte Gallensalz, fördernd durch darauffolgenden Wasserzusat. Je nach

der Combination dieser 3 Bedingungen wechselt der Werth des Optimum bei einem und demselben Extractivstoffe.

Von diesen 3 Bedingungen können die beiden letzteren (Gallensalzzufatz und Wässerung) willkürlich normirt werden, die erstere aber ist gegeben und zugleich sehr variabel. Man könnte nun daran denken, dieselbe zu messen, indem man vor Zusatz des Gallensalzes an einer Plasmaprobe die Gerinnungszeit bestimmt; je nach dem Ausfall der Messung liesse sich dann der Gallensalzzufatz so variiren, das eine passende Grösse der Gerinnungstendenz, und zwar immer ein und dieselbe Grösse, resultiren würde, so das der spätere Wasserzufatz als überflüssig wegfiel; würde man nun unter solchen Umständen mit gewogenen Quantitäten der Extractivstoffe arbeiten, so würde man vergleichbare Optima für dieselben erhalten und eine Skala ihrer Wirksamkeit aufstellen können. Aber die Bestimmung der Gerinnungszeit¹⁾ kostet eben, namentlich beim filtrirten Plasma, viel Zeit; unterdessen unterliegt der übrige zum Versuch selbst bestimmte Theil der Flüssigkeit, trotz der Aufbewahrung in der Kälte, gewissen für den Versuch nachtheiligen, fortschreitenden Veränderungen, so das derjenige Gallensalzzufatz, welcher sich aus dem Vorversuch ableiten läst, für den Rest der Flüssigkeit nun nicht mehr paßt, und man schliesslich doch willkürlich verfahren mus.

Ich habe deshalb immer nur die gleichen Zusätze von Gallensalz gemacht, welche ein für alle Mal erfahrungsgemäfs so grofs gewählt worden waren, das sie die Gerinnbarkeit des Blutplasma, je nach der Natur desselben, ganz oder fast ganz unterdrückten, und dieselbe dann gleichfalls

1) Welche übrigens, wie sich sogleich zeigen wird, keinen sicheren Maasstab abgiebt.

mit gewissen feststehenden Wassermengen wieder wachgerufen. Die Gerinnbarkeit nach dem Wasserzusatz fiel deshalb je nach der Beschaffenheit des zum Versuch benutzten Aderlassblutes sehr verschieden aus, war aber immer viel geringer als die des natürlichen Plasma. Ohne Rücksicht auf diese Differenzen habe ich ferner immer mit den gleichen Gewichtsmengen der einzelnen Extractivstoffe, d. h. jeden für sich betrachtet, gearbeitet, weshalb ich dieselben auch nicht nach ihrer Wirksamkeit zu einer Reihe anordnen kann. Aber soviel liess sich in jedem einzelnen Versuch feststellen, dass es stets ein Optimum des Zusatzes gab bis zu welchem diese Stoffe beschleunigend und über welches hinaus sie hemmend auf die Gerinnung wirkten.

In Betreff des Gallensalzes und des Wassers kann man sagen, dass ein Plus derselben das Optimum des Zusatzes der Extractivstoffe in jedem gegebenen Falle mit Sicherheit steigert resp. herabsetzt; dagegen giebt die vor dem Gallensalzzusatz bestimmte Gerinnungszeit des Plasma keinen absolut sicheren Maassstab für das Optimum ab, da es nicht selten vorkommt, dass in einem gegebenen Falle von kürzerer Gerinnungszeit das Optimum doch höher liegt, als in einem anderen von längerer Gerinnungszeit. Hier müssen also noch andere, unbekannte, mit der Beschaffenheit des Plasma zusammenhängende Bedingungen mitspielen.

Ich muss noch bemerken, dass die Curven, welche die Wirkung des Gallensalzes, des Wassers und der Extractivstoffe ausdrücken, sehr steil abfallen resp. ansteigen. In Bezug auf die mehr oder weniger vollständige Unterdrückung der Gerinnbarkeit macht z. B. 0,1% Gallensalz einen sehr bedeutenden Unterschied; ebenso bedingt, bezogen auf 1 Ccm. Gallensalzplasma, ein Tropfen Wasser mehr oder weniger eine ausserordentlich beträchtliche Differenz in Betreff des

Grades der wiederhervorgerufenen Gerinnbarkeit. Diese Verhältnisse habe ich aber immer nur empirisch regulirt, und auch deshalb konnte es vorkommen, daß ein und dieselbe Quantität eines Extractivstoffes das eine Mal fördernd und das andere Mal hemmend auf die Gerinnung des Gallensalzplasma einwirkte.

Ganz ohne Wasserzuzatz habe ich übrigens garnicht gearbeitet, weil ich die zuzusetzenden Extractivstoffe stets mit 2 Tropfen Wasser (auf 1 Ccm. Gallensalzplasma bezogen) auflöste resp. anfeuchtete.

Die bei Weitem größte Mehrzahl meiner Versuche habe ich feiner leichten Löslichkeit wegen mit dem Glycin angestellt, welches sich in den von mir dem Gallensalzplasma zugesetzten Wassermengen stets vollkommen auflöste. Von den in Wasser unlöslichen Extractivstoffen habe ich mehrere sehr wirksam gefunden; ein Bruchtheil derselben muß sich also im Plasma resp. Gallensalzplasma aufgelöst haben, da Controlleversuche mit Asbest und mit pulverförmigen, unlöslichen Körpern zeigten, daß von einer mechanischen Wirkung hierbei nicht die Rede sein konnte. Wie groß aber der in Lösung übergegangene Bruchtheil dieser Stoffe war, ließ sich bei der Kleinheit der Massen, welche ich in Anwendung brachte, nicht annähernd bestimmen.¹⁾

Ich führe nun aus meinen, das unfiltrirte Plasma betreffenden Protokollen ein Beispiel an, an welchem sich die Wirkung dieser Stoffe ganz gut erläutern läßt. Die Zahlen im ersten horizontalen Tabellenstab bedeuten Gramme, die in Minuten ausgedrückten Gerinnungszeiten im zweiten und dritten horizontalen Stabe beziehen sich auf Gallensalz-

1) Die Wirkung der in Wasser unlöslichen Extractivstoffe, welche sich schnell zu Boden senken, wird durch zeitweiliges Vertheilen in der Flüssigkeit in hohem Grade befördert.

plasma von zwei Aderläffen an zwei verschiedenen Pferden. Die Rubrik 0,0 bedeutet das Controllepräparat, welches keinen Zusatz an Glycin, selbstverständlich aber den betreffenden Wafferezusatz erhalten hatte.

		aa mit Wasser				1 : 2 Wasser			
Zusatz an Glycin auf 1 Ccm.		0,0	0,004	0,010	0,050	0,0	0,004	0,010	0,050
Gerinnungs- zeit	1 1/2 % Gallensalz- plasma.	57'	42'	48'	63'	35'	36'	43'	53'
	2 % Gallensalz- plasma.	46'	41'	39'	37'	29'	28'	32'	35'

Vergleicht man nun diese beiden Reihen, so sieht man zunächst, daß bei der Verdünnung mit gleichen Theilen Waffer fast durchweg eine Beschleunigung der Gerinnung zu verzeichnen ist; nur der Zusatz 0,050 hat hemmend eingewirkt. In der ersten Reihe (bei Verdünnung mit gleichen Theilen Waffer) mag das Optimum des Zusatzes noch unter 0,004, in der zweiten über 0,050 liegen. Bei der Verdünnung mit 2 Theilen Waffer ist die Verlangsamung der Gerinnung durch die Zusätze deutlich; nur der kleinste Zusatz (0,004) hat bei der 2 % igen Lösung um ein ganz Geringes beschleunigend gewirkt. Es ist auch ersichtlich, daß das Optimum des Zusatzes bei der 2 % igen Lösung viel höher liegt als bei der 1 1/2 % igen.

Es ist jetzt verständlich, warum v. Samson beim reinen filtrirten Plasma so widersprechende Resultate fand. Die Gerinnungstendenz des reinen filtrirten Plasma ist eben an sich eine sehr große, und wirkten daher die nach Augenmaass zugesetzten Extractivstoffe in seinen Versuchen störend auf die Gerinnung. Dieselben Verhältnisse finden wir ja auch sonst bei der Gerinnung; so wirkt z. B. ein zu großer Zusatz von Lymphdrüsenzellen zum kranken Plasma mit herabge-

setzter Gerinnungstendenz hemmend, während eine geringe Quantität starkbeschleunigend wirkt.

Da das unfiltrirte Plasma selbst mit 2 % Gallensalz bereits nach 24 Stunden flockige Trübungen zeigte, die Flüssigkeit keine homogene mehr war und in verschiedenen Schichten verschiedene Gerinnbarkeit befaß, sich also nicht mehr gut zu meinen Versuchen gebrauchen liefs, so ging ich zu filtrirtem Plasma über.

Es ist von Wichtigkeit, daß das Blutabnehmen, das Abkühlen und das Filtriren des Blutes möglichst rasch vor sich gehen, da ja bekanntlich auch beim gekühlten Plasma die Fermententwicklung vor sich geht, das Gallensalz dann aber nicht mehr so gut wirkt. Andererseits ist aber auch das Gefrieren des Plasma sorgfältig zu vermeiden, da hierbei eine große Anzahl von Leukocyten zerstört wird, deren Zerfallsproducte alsdann nach dem Auftauen die Gerinnung in ungeheuerem Maasse fördern. Was das Filtriren des Plasma betrifft, so genügte ein dreifaches Filtrum guten Filtrirpapiers vollkommen, d. h. ich erhielt ein ganz zellenfreies Plasma. Indem ich bei Weitem größere Quantitäten Plasma als ich zu filtriren beabsichtigte, auf das Filtrum brachte, kürzte ich ver mö ge des hohen Filtrationsdruckes den Filtrationsproceß nicht unwesentlich ab. Das Filtriren geschah natürlich auf einem Doppeltrichter, zwischen dessen Wänden sich Eiswasser befand. Eine starke Kältemischung ist nicht rathsam, da das Plasma sehr leicht im Filtrum friert und das letztere dann gewechselt werden muß; das ist natürlich mit Substanz- und Zeitverlust verbunden; es genügt bei raschem Filtriren vollständig den äußeren Trichter mit Eiswasser zu füllen.

Auch bei meinen Versuchen mit filtrirtem Gallensalzplasma, welches in allen meinen Versuchen 1 % Gallensalz

enthielt, habe ich schwache und starke Verdünnung angewendet, indem ich in einer Reihe nur 2 Tropfen zu 1 Ccm. Plasma hinzusetzte, in einer andern Reihe $\frac{1}{2}$ Ccm. Wasser. Unverdünntes Gallensalzplasma habe ich auch hier nicht verwendet; das Wasser benutzte ich zugleich um die Extractivstoffe darin aufzulösen, resp. die unlöslichen anzufeuerten.

Die bei dem unfiltrirten Gallensalzplasma gemachten Erfahrungen bestätigten sich hier vollkommen. In der Verdünnung mit 2 Tropfen Wasser riefen die Zusätze stets eine bedeutende Beschleunigung der Gerinnung hervor gegenüber dem Controllepräparat, welches natürlich auch mit 2 Tropfen Wasser versetzt war; bei den mit $\frac{1}{2}$ Ccm. Wasser verdünnten Präparaten trat dagegen häufig ein Umschlag in der Wirkung der Extractivstoffe in das Gegentheil ein. Zum Beweise führe ich einige Versuche mit Glycin und Leucin aus meinen Protokollen an. Wiederum beziehen sich die Präparate I, II und III in der ersten Tabelle auf drei verschiedene Aderlässe. Die absolute Gröfse der Zusätze an Glycin und Leucin war willkürlich normirt worden.

mit 2 Tropfen Wasser				mit $\frac{1}{2}$ Ccm. Wasser					
Zusatz an Glycin	0,0	0,003	0,210	0,0	0,004	0,020	0,050	0,150	
I	105'	95'	59'	34'	35'	36'	41'	45'	
Gerinnungs- zeit	II	157'	105'	85'	58'	50'	59'	70'	98'
III	264'	197'	125'	78'	62'	80'	95'	130'	
mit 2 Tropfen Wasser				mit $\frac{1}{2}$ Ccm. Wasser					
Zusatz an Leucin	0,0	0,002	0,005	0,007	0,010	0,0	0,005	0,017	
Gerinnungszeit	124'	112'	110'	106'	104'	65'	71'	85'	

Bei genauer Durchmusterung dieser Beispiele finden wir, daß sie mit den oben angeführten vollständig übereinstimmen. Bei der Verdünnung mit 2 Tropfen Wasser ist durchweg eine mit der Gröfse des Zusatzes an dem betreffenden Extractivstoffe wachsende Beschleunigung zu verzeichnen.

Bei der Verdünnung mit $\frac{1}{2}$ Ccm. Wasser dagegen fast durchweg eine wachsende Verlangsamung zu bemerken; eine Ausnahme bilden nur die mit $\frac{1}{2}$ Ccm. Wasser verdünnten Präparate sub II und III der ersten Tabelle mit dem geringsten Zusatz von Glycin; bei II und III ist ja aber auch die Gerinnungstendenz des Plasma eine geringere, als in I, wie aus der Gerinnungszeit der in der Rubrik 0,0 enthaltenen Controllepräparate hervorgeht. Ganz das Gleiche lehrt der Versuch mit Leucin. —

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse meiner übrigen mit den Extractivstoffen und filtrirtem Gallensalzplasma angestellten Versuche. Der Zusatz an taurocholsaurem Natron betrug durchweg 1 % der Wasserzuzatz durchweg 2 Tropfen. Das Gallensalzplasma an sich (ohne den Zusatz von 2 Tropfen Wasser pro Ccm.) blieb in allen diesen Versuchen permanent flüssig. Die Quantitäten der Zusätze sind wiederum theils willkürlich, theils nach gewissen Anhaltspunkten gewählt worden, welche einige in die Tabelle nicht weiter aufgenommene Vorversuche mir an die Hand gaben.

Aus den Zahlen im Tabellenstab 0,0 (Controlle) ersieht man, wie verschieden die Gerinnungszeit in den von verschiedenen Aderlässen stammenden Präparaten bei im Uebrigen gleicher Versuchsanordnung ausfällt. Diese Differenzen können eben nur durch die Natur des jedesmaligen Blutplasma bedingt sein. Zugleich ersieht man beim Vergleich verschiedener Präparate unter einander, daß die Gerinnungszeit der Controllepräparate (wie bereits früher erwähnt worden) durchaus keinen sicheren Maassstab abgiebt für die GröÙe des Optimum, denn wir sehen nicht selten, daß dasselbe bei längerer Gerinnungszeit des Controllepräparates doch kleiner ausfällt, als in einem anderen Versuch mit dem

selben Extractivstoffe, trotz kürzerer Gerinnungszeit des betreffenden Controllepräparates.

Hierbei muß ich aber nochmals betonen, was sich in der Tabelle nicht ausdrücken läßt, daß in einem gegebenen Blutplasma mit einem gegebenen Extractivstoffe das Optimum stetig wächst je mehr man die Gerinnungstendenz desselben durch Gallensalzzusatz herabdrückt und daß es stetig sinkt je mehr man die Gerinnungstendenz durch Wasserzusatz wieder hervorruft.

Daß die Gerinnungszeiten der Controllepräparate in der jetzt folgenden Tabelle viel größer ausgefallen sind, als in den oben angeführten, erklärt sich zunächst aus dem Umstande, daß ich auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen für günstigere Bedingungen bei Herstellung des Gallensalzplasma, wie namentlich für raschere Abkühlung des Blutes, höheren Filtrationsdruck, Aufbewahrung des Plasma nach Gallensalzzusatz in der Kälte sorgte. Besonders kam mir bei diesen Versuchen, welche im Winter stattfanden, die niedrige Außentemperatur zu Statten, welche mir die rasche Abkühlung des Blutes erleichterte und es mir zugleich möglich machte das Plasma während des Filtrirens, ohne daß es gefror, constant auf 0° zu erhalten.

Die Zahlen in den mit den gleichen römischen Ziffern versehenen horizontalen Tabellenstäben beziehen sich jedes Mal auf eine einzige Versuchsreihe, in welcher ich die sechs in der Tabelle angeführten Extractivstoffe durchprüfte. Die letzteren wurden, wie man aus der Tabelle ersieht, in steigenden Mengen angewendet, welche für einen und denselben Extractivstoff sich gleich blieben, für verschiedene aber verschieden ausfielen. Das zu diesen fünf Versuchsreihen benutzte Gallensalzplasma entstammte jedes Mal einem besonderen Aderlaß und zwar von fünf verschiedenen Pferden.

In der Tabelle sind diese Versuche nach den zugesetzten Extractivstoffen, der besseren Uebersicht wegen, geordnet. Aus dieser Anordnung erklärt sich die Wiederholung der auf die Controllepräparate sich beziehenden Zahlen in den verschiedenen Abschnitten des mit der Ueberschrift 0,0 versehenen verticalen Tabellenstabes. — In der ersten Versuchsreihe wurden das Glycin und Leucin nicht mitgeprüft, in der zweiten fehlt nur das Leucin, in der fünften die Harnsäure.

Sieht man sich die nebenanstehende Tabelle genauer an, so findet man, daß die Harnsäure im Ganzen am stärksten beschleunigend gewirkt hat, das Kreatin und Hypoxanthin am schwächsten. Das **Optimum** ist ziemlich schwankend, fällt jedoch sehr häufig mit dem Maximum des Zusatzes zusammen, liegt mithin in diesen Fällen vielleicht noch höher als dieses.

Die Resultate der Versuche mit Lecithin und den anderen von mir zu Anfang dieser Arbeit genannten Extractivstoffen stimmten mit dem bisher Gesagten durchaus überein. Ich habe sie nicht in die Tabelle aufgenommen, weil ich in diesen Versuchen nicht mit gewogenen, sondern nur mit nach Augenmaafs bestimmten Quantitäten arbeitete.

Was nun den Harnstoff anbetrifft, so habe ich schon oben angedeutet, daß er gegenüber den übrigen Extractivstoffen eine Sonderstellung einnimmt. Es gelang durch den Harnstoff nie, weder in den unfiltrirten noch in den filtrirten Gallensalzplasmalösungen, eine Beschleunigung der Gerinnung hervorzurufen. Die kleinstmöglichen Harnstoffmengen, welche ich verwendete, verhielten sich ganz indifferent. Von der Grenze 0,001 Grm. auf 1 Ccm. Gallensalzplasma verlangsamte er die Gerinnung mehr und mehr, wobei, wiederum von einer gewissen Grenze an, ein leimgallertiges Gerinnsel entstand, welches absolut kein Contractionsvermögen besaß und unter dem Druck der Finger in Stückchen zerging, ohne

Zusatz an Glycin	0,0	0,004	0,010	0,030	0,050
II.	ca 40 ^h	3 ^h 45'	3^h35'	6 ^h 25'	ca 10 ^h
III.	ca 72 ^h	ca 20 ^h	8 ^h	5 ^h 35'	4^h50'
IV.	5 ^h 20'	4 ^h	3 ^h 40'	3 ^h 10'	2^h30'
V.	ca 14 ^h	4 ^h 40'	3^h	3 ^h 30'	5 ^h
Zusatz an Taurin	0,0	0,001	0,008	0,014	0,034
I.	ca 58 ^h	ca 48 ^h	9^h35'	10 ^h 40'	11 ^h
II.	ca 40 ^h	ca 35 ^h	3 ^h 55'	3^h40'	8 ^h 10'
III.	ca 72 ^h	ca 48 ^h	ca 36 ^h	6 ^h 25'	5^h45'
IV.	5 ^h 20'	3 ^h 55'	3 ^h 55'	3 ^h 50'	3^h45'
V.	ca 14 ^h	4 ^h 55'	3^h 5'	3 ^h 30'	4 ^h 40'
An Hypoxanthin	0,0	0,001	0,003	0,008	0,010
I.	ca 58 ^h	ca 58 ^h	ca 51 ^h	ca 48^h	ca 53 ^h
II.	ca 40 ^h	12 ^h	8^h40'	11 ^h	ca 14 ^h
III.	ca 72 ^h	ca 35 ^h	ca 30 ^h	7^h	ca 20 ^h
IV.	5 ^h 20'	4 ^h 20'	4 ^h 20'	3 ^h 40'	3^h 15'
V.	ca 14 ^h	8 ^h 30'	8 ^h	7 ^h 10'	6^h 15'
An Kreatin	0,0	0,003	0,008	0,012	0,023
I.	ca 58 ^h	ca 58 ^h	ca 54 ^h	ca 50 ^h	12^h
II.	ca 40 ^h	ca 40 ^h	ca 40 ^h	5^h10'	9 ^h 30'
III.	ca 72 ^h	ca 72 ^h	ca 72 ^h	10^h	ca 48 ^h
IV.	5 ^h 20'	5 ^h 15'	5 ^h 10'	5 ^h	4^h55'
V.	ca 14 ^h	12 ^h	11 ^h	10 ^h	5^h20'
An Harnsäure	0,0	0,001	0,003	0,006	0,012
I.	ca 58 ^h	10 ^h	3 ^h 40'	3 ^h 10'	2^h20'
II.	ca 40 ^h	2^h25'	3 ^h 45'	5 ^h 15'	5 ^h 25'
III.	ca 72 ^h	7 ^h 40'	5 ^h 25'	5 ^h 15'	4^h50'
IV.	5 ^h 20'	3 ^h 35'	3 ^h 5'	2 ^h 55'	2^h 10'
An Leucin	0,0	0,002	0,005	0,009	0,020
III.	ca 72 ^h	ca 48 ^h	ca 24 ^h	6^h25'	ca 20 ^h
IV.	5 ^h 20'	5 ^h	3 ^h 35'	2 ^h 55'	2^h50'
V.	ca 14 ^h	10 ^h	5^h 5'	6 ^h 30'	6 ^h 40'

dafs es möglich gewesen wäre auch nur ein Tröpfchen Flüssigkeit dabei auszupressen. Quantitäten von mehr als 0,01 Gramm Harnstoff wirkten absolut gerinnungshemmend auf das Gallensalzplasma. Zur Erzielung gleicher Effecte beim reinen Plasma sind nur grössere Quantitäten Harnstoff erforderlich. Kurz der Harnstoff wirkte ganz wie die Neutralsalze auf die Gerinnung, d. h. je nach der Menge entweder garnicht oder nur hemmend. Auch von den Neutralsalzen ist es ja bekannt und von A. Schmidt mehrfach betont worden, dafs sie in gewissen mittleren Mengen, indem sie den Gerinnungsprocess verlängern, die Entstehung eines leimgallertartigen Faserstoffes bedingen.

Auch ich bin geneigt mich der Vermuthung von v. S a m s o n anzuschliesen, dafs dieses Verhalten des Harnstoffes im Gegensatz zu den übrigen Producten der regressiven Metamorphose der Eiweisskörper, nämlich die Unmöglichkeit durch denselben die Gerinnung des Gallensalzplasmas zu beschleunigen, dem Umstande zuzuschreiben ist, dafs demselben als Endprodukt der regressiven Metamorphose keines wirkfamen Bestandtheile, eventuell kein Fibrinferment, mehr abgespalten werden können. Es erscheint mir aber andererseits auch gerade dieser Umstand eine nicht unwesentliche Stütze für die Annahme zu sein, dafs es sich bei der Wirkung der übrigen Extractivstoffe auf die Gerinnung um solche Spaltungsvorgänge handelt.

Nachdem ich nun die Bedingungen festgestellt, unter welchen diese Extractivstoffe auf die Gerinnung des Plasmas einwirken, suchte ich zu ermitteln, ob die durch dieselben bewirkte Gerinnungsbeschleunigung auf einer wirklichen von ihrer Gegenwart abhängigen Mehrerzeugung von Fibrinferment und nicht vielmehr auf einer Beseitigung gewisser natürlicher relativer Gerinnungshindernisse beruht.

Der einfachste und schlagendste Beweis wäre natürlich gegeben, wenn durch die Extractivstoffe in vollkommen fermentfreien, das Substrat der Faserstoffgerinnung enthaltenden Flüssigkeiten eine Gerinnung hervorgerufen würde. Die Versuche, die ich zu dem Zwecke mit dem Schmidt'schen Salzplasma anstellte, gaben aber durchaus negative Resultate. Es war dies andrerseits aber auch zu erwarten, da die schwefelsaure Magnesia, wie bekannt, ja eben die Spaltungsproceß, aus welchen das Fibrin ferment hervorgeht, unterdrückt, worauf ja gerade die Gerinnungsunfähigkeit des mit diesem Salze vermischten Blutplasma resp. die Darstellung des Schmidt'schen Salzplasma als Reactionsflüssigkeit gegen freies Fibrin ferment beruht.

Rauschenbach¹⁾ hat gezeigt, daß in mit destillirtem Wasser verrührtem Lymphdrüsenzellenbrei eine allmähige, wenn auch sehr unbedeutende Fermentabspaltung stattfindet, ein Vorgang der im Plasma in viel eminentem Maße vor sich geht. Gelingen ein solcher Versuch auch mit den Extractivstoffen, so wäre die Bedeutung derselben als unmittelbare Fermentquellen erwiesen; es war aber andrerseits auch hier kaum zu erwarten, daß in einer wässerigen Lösung dieser chemisch reinen Substanzen, wie z. B. des Glycin, solche Proceß Platz greifen würden, und der Erfolg entsprach dieser Erwartung, d. h. die betreffenden Versuche blieben resultatlos.

Ich ging nun an die Bestimmung des Fermentgehaltes des Serum von 1 % filtrirtem Gallensalzplasma ohne und mit Zusatz von Extractivstoffen.

Zu den Fermentbestimmungen habe ich nur das Gly-

1) Rauschenbach. Ueber die Wechselwirkung von Protoplasma und Blutplasma. Inaug. Diss. Dorpat 1882. pag. 26 ff.

cin und die Harnsäure verwendet und zwar lediglich aus dem Grunde, weil mir von diesen Substanzen die relativ größten Mengen zu Gebote standen. Es wurden in mehreren Versuchen 2 Proben von je 10 Ccm. filtrirtes Gallensalzplasma mit je 1 Ccm. Wasser versetzt und zu der einen Probe 0,2 Gramm Glycin resp. 0,05 Gramm Harnsäure hinzugefügt. Nach vollkommen beendeter Gerinnung in beiden Präparaten (meist nach 2 Mal 24 Stunden) und nach Entfernung des Faserstoffes brachte ich die Sera unter das 15-fache Vol. 96% Alcohol. Nach ca. 14 Tagen wurde das Coagulum abfiltrirt mit absolutem Alcohol und Aether ein Paar Mal ausgewaschen und zwischen Filtrirpapier gründlich ausgepresst. Nachdem es 2 Tage an der Luft getrocknet, wurde es pulverisirt gewogen und mit dem 15-fachen Gewicht Wasser eine Stunde extrahirt und dann filtrirt. Das Filtrat wurde zu 10 Theilen mit einem Theil Salzplasma gemischt, und die Gerinnungszeit notirt. Die Fermentbestimmung ergab nun in allen den Fällen, wo durch das Glycin resp. die Harnsäure eine Beschleunigung der Gerinnung hervorgerufen worden, auch eine Vermehrung des Fermentgehaltes der Sera. Die Resultate lasse ich gleich folgen. Der Fermentgehalt ist in Fermenteinheiten ausgedrückt, wobei als Fermenteinheit diejenige Fermentmenge gilt, welche nach 100 Minuten die Gerinnung des Salzplasma hervorruft.

	Mit Zusatz von Glycin	ohne denselben
I	0,416	0,333
II	0,862	0,806
III	1,111	1,053

Bei der Harnsäure, die ja, wie bereits früher gesagt, sich bedeutend wirksamer erwies, als das Glycin, gab die Fermentbestimmung auch einen bedeutend größeren Zuwachs an Ferment.

	Mit Harnsäure	ohne dieselbe
I	2,707	0,526
II	3,846	0,689

In einem Falle, wo durch den Zusatz von Glycin keine Abkürzung der Gerinnungszeit eingetreten war, sondern eine Verlängerung, der Zusatz mithin als überschüssiger gewirkt hatte, ergab die Fermentbestimmung:

Mit Glycin	ohne dasselbe
0,575	1,042

Dieser Versuch ergibt also das interessante Resultat, daß ein Ueberschuß dieser Substanzen die bezüglichlichen Spaltungen geradezu hemmt. —

Schließlich habe ich noch den Einfluß der Extractivstoffe auf die sogenannten proplastischen d. h. gerinnbaren, aber spontan nicht gerinnenden (weil kein Fibrinferment enthaltenden, noch in sich entwickelnden) Körperflüssigkeiten untersucht. Als solche dienten mir Hydroceleflüssigkeit vom Menschen¹⁾, ferner Pericardial-, Pleura- und Peritonealflüssigkeit von mehreren hier geschlachteten Pferden. Die meisten dieser Flüssigkeiten waren von vorn herein völlig leukocytenfrei oder sie erschienen doch nur ganz schwach von ihnen getrübt; wo letzteres der Fall war, wurden sie durch Filtriren in der Kälte leicht völlig geklärt.

Diese Flüssigkeiten besitzen bekanntlich, selbst wenn sie Leukocyten enthalten, gar keine Neigung zu gerinnen; das dem Blutplasma eigene Vermögen das Fibrinferment aus seinen Mutterstoffen abzuspalten geht ihnen eben ab, weshalb ja auch Raufschénbach fand, daß frisch ausgepresste Lymphdrüsenzellen gar keine Wirkung auf sie aus-

1) Ich erhielt aus der chirurgischen Klinik etwa 100 Ccm. einer vollkommen klaren, frisch punktirten Hydroceleflüssigkeit.

übten. Demnach ist nicht zu verwundern, daß auch die Extractivstoffe, von welchen ich hier übrigens nur das Glycin und die Harnsäure prüfte, sich durchaus indifferent gegen sie verhielten. Ich variierte die Quantitäten meiner Zusätze in mannigfachster Art, der Erfolg war aber constant negativ. Die Flüssigkeiten, verhielten sich in dieser Hinsicht wie Plasma, dessen Gerinnungstendenz durch das zugesetzte Gallensalz absolut unterdrückt worden. Ein Zusatz des letzteren hatte aber in diesen Flüssigkeiten a priori keinen Sinn und erwies sich auch durch den Versuch als irrelevant; kurz die Resultate waren durchaus negative.

Ganz anders gestalten sich die Verhältnisse, sobald man in diesen Flüssigkeiten durch Zusatz von Blutserum den Gerinnungsproceß hervorruft. Sobald dieses der Fall war, wirkten das Glycin und die Harnsäure in hohem Grade beschleunigend auf die Gerinnung, so daß man annehmen muß, daß dieser durch das freie Ferment hervorgerufene Proceß selbst die Neuerzeugung von Fibrinferment bedingt, also auch die betreffenden Spaltungen einleitet. Statt des Blutserum kann man in diesen Versuchen auch mit Erfolg eine Fibrinfermentlösung anwenden, sobald sich durch einen Vorversuch ergibt, daß dasselbe genügt, um in der betreffenden protoplastischen Körperflüssigkeit den Eintritt der Gerinnung zu bewirken, d. h. sobald dieselbe genügend paraglobulinhaltig ist.

Die Versuche mit diesen Flüssigkeiten sind natürlich viel einfacher und bequemer als mit dem Blutplasma, da man hier nicht, wie beim letzteren, einen bereits bestehenden resp. beginnenden Gerinnungsschemismus vorläufig zu unterdrücken, sondern einen noch garnicht vorhandenen willkürlich hervorzurufen hat ohne die nothwendige, beschwerliche, zeitraubende und daher doch mit Fehlerquellen behaftete Voroperation des Filtrirens in der Kälte und des Gallen-

salzzufatzes. Wegen der dem Plasma innewohnenden spontanen Gerinnungsenergie unterliegt dasselbe trotz des Gallenfalzzufatzes und trotz der Aufbewahrung in der Kälte gewissen langsam fortschreitenden Veränderungen, so daß schon im Laufe von 24 Stunden die Resultate der Versuche mit den Extractivstoffen in quantitativer Hinsicht andere sind als sie am Tage vorher waren. Die proplastischen Flüssigkeiten aber sind baar jeder Gerinnungsenergie; dieselbe wird erst im Momente des Versuches selbst durch Zumischung von Blutserum oder von Fibrinferment erzeugt.

Des Gallenfalzes bedarf man auch hier nicht, da man diesen Mischungen jede beliebige Gerinnungstendenz geben kann, indem man den Serum- oder Fermentzufatz nach Bedürfnis regulirt. Die Wirkung der Extractivstoffe wird aber natürlich um so deutlicher wahrnehmbar, je langsamer die Gerinnung der Mischung an und für sich verläuft. Ich habe gewöhnlich 1 Vol. meiner proplastischen Flüssigkeiten mit $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{2}$ Vol. Serum oder einer schwachen Fermentlösung versetzt. Wegen der alkalischen Reaction der Mischungen verlief unter solchen Umständen die Gerinnung (bis zur vollkommenen Fibrinausscheidung) meist in 1—2 Stunden, eine Zeit die durch grössere Zusätze von Extractivstoffen nicht selten sogar auf einige Minuten zusammenschrumpfte.

In soweit verhielten sich diese künstlichen Gerinnungsmischungen qualitativ ganz wie das Blutplasma; in einer Beziehung jedoch markirte sich ein deutlicher Unterschied. Es gelang mir nämlich hier nicht die hemmende Wirkung der Extractivstoffe durch überschüssigen Zusatz derselben zu Stande zu bringen. Die Beschleunigung wuchs mit dem Zusatz bis zu einer gewissen Grösse desselben, über welche hinaus sie constant blieb; aber eine hemmende Wirkung des Ueberschusses war nicht wahrnehmbar. Indem ich durch

vorausgehendes Abstumpfen der Alkalescentz mit verdünnter Salzfäure für neutrale Reaction meiner Gerinnungsmischungen sorgte und ihnen zugleich einen gröfseren Gehalt an Serum resp. Fermentlösung gab (im Verhältnifs von 1 : 1), erhöhte ich ihre Gerinnungstendenz derart, dafs der Procefs in ein Paar Minuten beendet war. In solchen Fällen wirkten die Extractivstoffe, selbst wenn sie in Quantitäten zugesetzt wurden, welche sich für das Gallensalzplasma als viel zu grofs erwiesen hatten, entweder nur noch etwas beschleunigen oder sie hatten gar keine Wirkung; aber eine Hemmung der Gerinnung habe ich nie beobachtet. Hier also stellt sich eine Differenz zwischen den proplastischen Flüssigkeiten und dem Blutplasma heraus, welche ich, für jetzt wenigstens, un- erklärt lassen mufs.

Auch die Leukocyten verhielten sich gegen diese proplastischen Flüssigkeiten in der gröfseren Zahl der angestellten Versuche durchaus wie die Extractivstoffe, d. h. sie übten an und für sich, wie schon von Raufchenbach angegeben wird, gar keine Wirkung auf dieselben aus. Wenn aber durch Blutserum oder Fibrinfermentlösung die Gerinnung hervorgerufen wurde, so wurde dieselbe durch Zusatz von Leukocyten (aus Lymphdrüsen und proplastischen Flüssigkeiten) nach Maafsgabe der Gröfse dieses Zusatzes beschleunigt, ohne dafs es jedoch je möglich gewesen wäre, diese Wirkung bis zur Gerinnungshemmung zu steigern. Freilich kamen, wenngleich in der Minderzahl, Fälle vor, wo die Leukocyten sich absolut indifferent verhielten; diese Wirkungslosigkeit mufs auf besonderen Zuständen der Zellen selbst beruhen.

In Bezug auf diese die Leukocyten betreffenden Angaben trete ich mit Raufchenbach in Widerspruch, welcher angiebt, dafs nicht blofs die proplastischen Flüssig-

keiten selbst, sondern auch die aus ihnen hergestellten künstlichen Gerinnungsmischungen sich ganz indifferent gegen Leukocyten verhielten, eine Angabe, welche in mehrere andere aus dem hiesigen physiologischen Institute hervorgegangene Arbeiten übergegangen ist. Es ist nun nicht unwahrscheinlich, daß Raufschenbach es zufälliger Weise gerade mit unwirksamen Leukocyten zu thun gehabt hat, wie bei mir ja auch solche Fälle vorgekommen sind.

Zum Schluß will ich noch erwähnen, daß ich versuchte, mir aus dem Gallensalzplasma ein Dauerpräparat herzustellen durch Eindampfen im Vacuum über Schwefelsäure. Die Versuche mit $1\frac{1}{2}$ und 2 %igem unfiltrirtem Gallensalzplasma gaben negative Resultate: einerseits liefs sich der Trockenrückstand in der entsprechenden Quantität Wasser nicht mehr vollständig auflösen (am Boden blieb ein schleimiger Klumpen liegen), andererseits hatte das Plasma aber auch vollkommen die Fähigkeit zu gerinnen verloren; wenigstens gerann es weder bei erhöhtem Wasserzusatz, noch übten die Extractivstoffe irgend einen Einfluß auf dasselbe aus. Dagegen gelang es mir aus dem filtrirten Plasma nach Zusatz von 1 % Gallensalz mit Hülfe der Luftpumpe Dauerpräparate herzustellen, welche sich leicht und vollständig in dem entsprechenden Wasserquantum auflösen und sich in dieser Lösung ganz wie frisch dargestelltes, filtrirtes Gallensalzplasma verhielten. Hieraus läßt sich schließen, daß es die Leukocyten in den unfiltrirten Plasmapräparaten sind, welche während des Actes der Eindickung im luftleeren Raum Veränderungen in der betreffenden Flüssigkeit herbeiführen, welche die Unbrauchbarkeit der Trockenrückstände zu den von mir bezweckten Versuchen bedingen. Ich halte es aber für möglich, daß es bei Zusatz größerer Mengen Gallensalz gelingen würde auch aus dem unfiltrirten Gallen-

salzplasma brauchbare Dauerpräparate herzustellen. Nicht unerwähnt will ich lassen, daß das Gallensalzplasma sehr sorgfältig getrocknet und in trockenen, wohlverschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden muß, da durch Feuchtigkeit nachträglich noch Zersetzungen eintreten, welche das Präparat unbrauchbar machen. — Je nachdem man nun die gepulverten Trockenrückstände in mehr oder weniger Wasser wieder auflöst, erhält man Flüssigkeiten von größerer oder geringerer Gerinnungstendenz; man kann sich demnach mit Hülfe einiger vorläufiger Probeversuche diejenige Concentration ausfinden, welche zu den beabsichtigten Versuchen geeignet erscheint. Bei Auflösung des Trockenrückstandes in 12,5 Gewichtstheilen Wasser erhält man eine Lösung, deren Concentration annähernd genau derjenigen des ursprünglichen Gallensalzplasma entspricht.

Auch hier habe ich 2 Fermentbestimmungen gemacht. Die Probe mit Glycin ergab 0,416 Fermenteinheiten gegen 0,263 im Controllepräparat. Das mit Harnsäure versetzte Präparat, sowie die dazu gehörige Controlle brachte ich bereits 24 Stunden nach der Herstellung derselben unter Alkohol; ersteres war in einigen Stunden vollkommen geronnen, letztere dagegen war bis zuletzt durchaus flüssig geblieben, und eine Probe derselben veränderte sich während einer achtstägigen Beobachtung auch nicht. Die Fermentbestimmung ergab hier einen beträchtlichen Zuwachs an Ferment, nämlich 1,538 gegen 0,139. —

Fasse ich nun kurz die Resultate meiner Untersuchungen zusammen, so ergibt sich Folgendes:

Die Substanzen der regressiven Metamorphose der Eiweißkörper, den Harnstoff ausgenommen, üben eine beschleunigende Wirkung auf den Proceß der Faserstoffgerinnung aus; im Ueberschuß aber wirken sie hemmend. Daß

Optimum des Zusatzes dieser Stoffe ist um so kleiner, je größer die Gerinnungstendenz des Plasma ist und umgekehrt. Andererseits aber ist eine gewisse Neigung der betreffenden Flüssigkeiten zu gerinnen die Voraussetzung der Wirkung dieser Substanzen; wo sie fehlt, wie in proplastischen Flüssigkeiten oder im Blutplasma nach Zusatz größerer Mengen von Gallensalz, da verhalten dieselben sich gänzlich indifferent.

Auf künstliche Gerinnungsmischungen wirken die Extractivstoffe nur beschleunigend, niemals hemmend.

Die Beschleunigung der Gerinnung beruht auf einer erhöhten, die Hemmung auf einer verminderten Fermententwicklung.

Die Gallensalze wirken hemmend sowohl auf den Vorgang der Fermententwicklung als auch, wenngleich weniger intensiv, auf den der Fermentation. Dagegen hindern sie nicht den Vorgang der Ausscheidung des fermentativen Umwandlungsproduktes durch die Salzbestandtheile der betreffenden Flüssigkeiten.

Auf den erwähnten Wirkungen der Gallensalze beruht die Anwendung, die ich von ihnen in meinen Versuchen gemacht habe.

Der Ausdruck Gerinnung bezeichnet, wie ich ihn gebraucht habe, beim Blut und den verwandten Körperflüssigkeiten nicht bloß, wie beispielsweise bei einer Kieselsäurelösung, den Act der Ausscheidung einer in Lösung präexistirenden, coagulablen Substanz in unlöslicher Form, sondern er umfaßt zugleich eine Reihe von vorbereitenden Acten, durch welche diese lösliche aber coagulable (und zwar durch die Salze coagulable) Substanz als nächstes, unmittelbares Substrat der Faserstoffgerinnung erst gebildet wird. Wenn ich also im Vorhergehenden von „Gerinnungszeit, Gerin-

nungsverlauf“ u. f. w. gesprochen habe, so sind diese vorbereitenden Acte selbstverständlich hierbei mitgemeint; sie bestehen wesentlich in der Abspaltung des Fibrinfermentes von seinen Mutterstoffen und in der sich daran schließenden Fermentation. Mit dem Freiwerden des Fermentes beginnt also der Faserstoffgerinnungsproceß, sofern man den Ausdruck Gerinnung in dem obigen weiteren Sinne faßt. Die Extractivstoffe aber wirken um so energischer je langsamer das Ferment sich entwickelt, resp. je weniger freies Ferment die betreffende Flüssigkeit enthält, d. h. je geringer die Gerinnungstendenz derselben ist. Stellen diese Stoffe nun unmittelbare Fermentquellen dar, so würde folgen, daß Flüssigkeiten von geringer Gerinnungstendenz resp. von geringem Gehalt an freiem Ferment, am geeignetsten dazu sind, dasselbe von diesen feinen Mutterstoffen abzuspalten.

Nun enthält das circulirende Blut, wie bekannt, stets geringe Mengen an freiem Ferment, wodurch bewiesen wird, was A. Schmidt und seine Schüler stets betont und auch mit anderen Gründen gestützt haben, daß wenigstens der erste vorbereitende Act der Gerinnung, die Fermentabspaltung auch im circulirenden Blut stattfindet. Ueber die Intensität dieses Processes läßt sich nichts aussagen, weil der lebende Organismus, wie gleichfalls bekannt, durch rasche Eliminirung des Fibrinfermentes seine Ausscheidung nicht zu Stande kommen läßt, wir also auch nicht wissen können, wie viel Fibrinferment sich in der Zeiteinheit im circulirenden Blute bildet. Jedenfalls aber findet hier eine stetige Fermentabspaltung statt, und das circulirende Blut enthält demnach ebenso stetig geringe Mengen von Fibrinferment, d. h. es stellt eine Flüssigkeit dar, welche ununterbrochen zu gerinnen beginnt, anders ausgedrückt: das Plasma des circulirenden Blutes ist eine Flüssigkeit von

geringer Gerinnungstendenz, vergleichbar dem Gallensalzplasma resp. den künstlichen Gerinnungsmischungen in meinen Versuchen.

Sofern nun nach meinen Versuchen die Extractivstoffe wahre, unmittelbare Fermentquellen darstellen, halte ich es unter solchen Umständen nicht für zu kühn anzunehmen, daß sie im circulirenden Blute denselben, mit Freiwerden von Fibrinferment einhergehenden, Spaltungen unterliegen, wie im Gallensalzplasma und in den künstlichen Gerinnungsmischungen. Die Faserstoffgerinnung und speciell das Fibrinferment würde dadurch in nahe Beziehung treten zu den physiologischen Umsetzungen der weiteren Derivate der Eiweißkörper. Aber die Producte der regressiven Metamorphose der Eiweißkörper treten nun auch in eine nahe Beziehung zu den farblosen Blutkörperchen, denn auch diese sind, wie schon früher constatirt worden ist, wahre Quellen des Fibrinfermentes. Daß sie Lecithin enthalten, ist bekannt; Reinke hat im Pflanzenprotoplasma von *Aethalium septicum*, außerdem Xanthin, Sarkin, Guanin gefunden. Der Gedanke, daß alle diese Stoffe in Beziehung zu den Leucocyten stehen, d. h. von ihnen gebildet werden, liegt um so näher, als, so viel wir wissen, alle Fermente Producte des Zellenlebens sind. Daß außer den eben genannten auch die übrigen Producte der regressiven Metamorphose der Eiweißkörper im Protoplasma, speciell im thierischen, noch nicht nachgewiesen worden sind, ist bei der Schwierigkeit der Untersuchung kein Grund gegen die Annahme, daß sie darin enthalten sind. Ihr gleichzeitiges Vorkommen frei in der Blutflüssigkeit aber dient zur weiteren Stütze der auf ganz andersartigen Versuchen basirenden Annahmen Raufschénbach's und besonders Groth's¹⁾, daß im circuli-

1) Otto Groth. Ueber die Schicksale der farblosen Elemente im kreisenden Blute. Inaug. Diss. Dorpat 1884.

renden Blute beständig farblose Blutkörperchen verbraucht werden.

Ich habe bei allen meinen bisherigen wie auch den nachfolgenden Versuchen nur die Frage nach der Herkunft des Fibrinfermentes im Auge gehabt. Die weitere Frage, inwiefern die Globuline des Blutes, speciell das Paraglobulin, wie von A. Schmidt angenommen wird, in Beziehung zu den farblosen Blutkörperchen steht, habe ich garnicht berühren wollen.

II.

Als A. Schmidt die Methode der Herstellung künstlicher Gerinnungsmischungen aus proplastischen Flüssigkeiten und Blutserum (später Fibrin fermentlösungen) gefunden hatte, fand er auch sogleich, daß die Gerinnung dieser Mischungen durch Zusatz rother Blutkörperchen außerordentlich befördert wurde. Ich habe unzählige Male Gelegenheit gehabt die Richtigkeit dieser Beobachtung zu constatiren; sie ist ebenso gültig für das Blutplasma wie für die künstlichen Gerinnungsmischungen. Ferner kann ich bestätigen, daß die Blutkörperchen des Rindes viel stärker wirken als die des Pferdes, und endlich, daß die Beschleunigung durch die Blutkörperchen um so deutlicher hervortritt je langsamer die betreffende Flüssigkeit an sich gerinnt.

Beispielsweise theile ich hier die Resultate dreier Versuche mit, von welchen die beiden ersten mit zwei verschiedenen Pericardialflüssigkeiten vom Pferde, der dritte mit gekühltem Pferdeblutplasma angestellt wurden. Das Serum zu diesen Versuchen gewann ich durch spontane Abscheidung aus Rinderblut.

Erster Versuch. 10 Ccm. Pericardialflüssigkeit werden mit 2 Ccm. Rinderserum gemischt. Die Faserstoffabscheidung tritt nach 37 Minuten ein.

10 Ccm. derselben Pericardialflüssigkeit werden mit 2

Ccm. Rinderblut (aus dem zum Serum gehörigen Blutkuchen gepresst) gemischt. Die Faserstoffausscheidung erfolgt nach $3\frac{1}{2}$ Minuten.

Der Unterschied der Gerinnungszeit in diesen beiden Versuchen kann doch nur auf Rechnung der rothen Blutkörperchen gesetzt werden.

Zweiter Versuch. 10 Ccm. Pericardialflüssigkeit mit 10 Ccm. Serum gemischt. Faserstoffausscheidung nach 49 Minuten.

10 Ccm. Pericardialflüssigkeit mit 8 Ccm. Serum und 2 Ccm. aus dem Kuchen gepressten Rinderblutes. Faserstoffausscheidung nach 1 Minute.

10 Ccm. Pericardialflüssigkeit mit 8 Ccm. Serum und 2 Ccm. ausgepressten Pferdeblutes. Faserstoffausscheidung nach 14 Minuten.

Die Probe mit Serum allein im zweiten Versuche gerinnt, trotz des beträchtlich größeren Serumzufatzes langsamer als die entsprechende Probe im ersten Versuche. Ob dies auf einer für Gerinnungsversuche ungünstigeren Zusammensetzung der betreffenden Pericardialflüssigkeit (Armut an Fibrinogenen oder relativ starke alkalische Reaction) oder auf geringerem Fermentgehalt des zum zweiten Versuche benutzten Rinderserum beruht, habe ich nicht weiter untersucht.

Dritter Versuch mit auf 0° abgekühltem Pferdeblutplasma (nicht filtrirt). Hier bedurfte es natürlich keines Serumzufatzes. Die Gerinnungsproben wurden unmittelbar nach ihrer Herstellung der Zimmertemperatur ausgesetzt.

Pferdeblutplasma ohne Zufatz. Gerinnungszeit 18 Minuten.

Desgleichen mit $\frac{1}{4}$ Vol. ausgepresster Pferdeblutkörperchen gemischt. Gerinnungszeit 70 Minuten.

Desgleichen mit $\frac{1}{4}$ Vol. ausgepresster Rinderblutkörperchen gemischt. Gerinnungszeit 13 Minuten.

Desgleichen mit $\frac{1}{10}$ Vol. ausgepresster Rinderblutkörperchen gemischt. Gerinnungszeit 27 Minuten.

Diese Versuche mögen genügen, um die Thatfache der Wirkfamkeit der rothen Blutkörperchen und zugleich den in dieser Hinsicht herrschenden Unterschied zwischen Pferde- und Rinderblutkörperchen nochmals zu constatiren. Ich bemerke nur noch, daß auch ich gefunden habe, daß die rothen Blutkörperchen nach ihrer Auflösung in Wasser qualitativ ebenso wirken wie im intacten Zustande¹⁾; ferner daß man bei diluirten proplastischen Flüssigkeiten, in welchen die rothen Blutkörperchen sich rasch zu Boden senken, die Wirkung derselben beträchtlich steigert, wenn man sie von Zeit zu Zeit durch Umrühren oder Schütteln in der Flüssigkeit wieder vertheilt.

Endlich führe ich noch an, daß die rothen Blutkörperchen auch die Gerinnungszeit des Gallensalzplasma beträchtlich abkürzen; nur sind die absoluten Gerinnungszeiten selbstverständlich hier viel größere als beim reinen Plasma.

Es handelt sich nun darum, diese Wirkung der rothen Blutkörperchen zu erklären. Sie war A. Schmidt, als er das Fibrinferment entdeckte, bereits seit lange bekannt und er suchte deshalb auch sogleich nach demselben in den rothen Blutkörperchen, welche als die eigentlichen Quellen des Fibrinfermentes erschienen. In derselben Weise hatte er früher, solange er das Paraglobulin allein für die bei der Gerinnung wirkfame Substanz ansah, für die rothen Blutkörperchen einen Gehalt an Paraglobulin angenommen.

Da nun aber das Blutserum stets freies Fibrinferment enthielt (in welchem es ja gerade entdeckt wurde), so er-

1) Sachssendahl giebt an, dass die Auflösung in Wasser die Wirkung steigere, worauf ich nicht weiter geachtet habe.

schien die völlige Trennung desselben von den rothen Blutkörperchen zum Nachweis des Fermentes in den letzteren absolut geboten. Wegen ihrer relativen Schwerlöslichkeit in Wasser schienen die Pferdeblutkörperchen das geeignetste Material zu diesen Versuchen darzubieten.

A. Schmidt verschaffte sich dazu zunächst möglichst serumarmes Pferdeblut, indem er dasselbe durch eine starke Kältemischung mehrere Stunden flüssig erhielt, das Plasma mit der obersten Schicht der gesenkten rothen Blutkörperchen entfernte, den Rest bei gewöhnlicher Temperatur gerinnen liefs (wobei wegen der grossen Plasmaarmuth immer nur ein sehr lockeres Coagulum entstand) und am folgenden Tag durch Leinwand presste. Oder er liefs das Pferdeblut ohne Weiteres gerinnen, presste das Coagulum aus und wartete die Senkung der rothen Blutkörperchen ab (welche er später durch die Centrifuge bewirkte).

Die syrupdicke, rothe Masse, welche er auf diese Weise erhielt, liefs sich nun mit einiger Vorsicht zu mehreren Malen mit Wasser dekantiren, wobei sich die rothen Blutkörperchen immer wieder zu Boden senkten. Der grössere Theil derselben ging bei dieser Manipulation zwar verloren, aber der Rest hatte, wenigstens mit Bezug auf die Wirkung auf die Faserstoffgerinnung, wie sich sogleich ergeben wird, immer noch die Zusammensetzung der ursprünglichen rothen Blutkörperchen. Dieser Rest wurde alsdann in der erforderlichen Menge Wasser unter Schütteln vollkommen gelöst, durch ein mehrfaches Filtrum filtrirt und zu den Versuchen benutzt.

Es fand sich nun, dafs dieses wässrige Blutkörperchenextrakt keine Spur von Fibrinferment enthielt; weder auf die Reactionsflüssigkeit gegen freies Ferment, das Schmidt'sche Salzplasma, noch auf proplastische Flüssigkeiten übte es den

mindesten Effect aus. Auch das Wasserextract des getrockneten Alcoholcoagulums dieser Blutkörperchenlösungen enthielt keine Spur von Fibrinferment. Die Entfernung der letzten Serumreste durch das Waschen der Blutkörperchen mit Wasser war also eine denkbar vollkommene und die Blutkörperchen selbst erwiesen sich hierdurch als fermentfrei, sofern das Waschen mit Wasser hier keinen Schaden angerichtet hatte.

Dafs letzteres nicht der Fall gewesen, ergab sich sofort daraus, dafs dieses wässrige Blutkörperchenextract in künstlichen Gerinnungsmischungen sowohl als im Blutplasma, kurz in Flüssigkeiten, in welchen der Gerinnungsproceß bereits eingeleitet war, qualitativ ebenso wirkte, wie die intacten Blutkörperchen selbst, d. h. beschleunigend; die wirksame Substanz war also noch vorhanden.

Da nun damals von der Bedeutung der farblosen Blutkörperchen als Quellen des Fibrinfermentes nichts bekannt war und mithin auch der Gedanke an die Stromata der rothen Blutkörperchen nicht nahegelegt wurde, welche letzteren sich außerdem im filtrirten Extract entweder gar nicht oder nur in sehr geringer Menge nachweisen ließen, so nahm A. Schmidt eine eigenthümliche Mitwirkung des Hämoglobins bei der Fibringerinnung an, welche darin bestände, dafs dasselbe zwar selbst keine Gerinnung einzuleiten vermöge, überhaupt keinen wesentlichen Gerinnungsfactor darstelle, wohl aber die Intensität eines bereits im Gange befindlichen Gerinnungsprocesses steigere resp. die Wirkung des Fibrinfermentes potenzire und zwar ohne selbst dabei verbraucht zu werden, also durch eine Art Contact, denn das Hämoglobin zeigte nach Beendigung der Gerinnung nicht die geringste Veränderung seiner Eigenschaften.

Seit wir nun aber die Bedeutung der Leukocyten als

Behälter für die Mutterstoffe des Fibrinfermentes kennen gelernt haben, ergibt sich uns die Möglichkeit einer anderen Auffassung der erwähnten Wirkungen der rothen Blutkörperchen von selbst. Die letzteren sind durch zweierlei charakterisirt:

1) sie sind fermentfrei, verhalten sich also in den sich nicht gerinnbaren proplastischen Flüssigkeiten durchaus indifferent;

2) im Blutplasma aber und in den aus proplastischen Flüssigkeiten hergestellten künstlichen Gerinnungsmischungen kürzen sie den Gerinnungsproceß in außerordentlichem Grade ab, was A. Schmidt in der soeben angegebenen Weise auf das Hämoglobin bezog. Anders ausgedrückt, föhbeschleunigen den Gerinnungsproceß in Flüssigkeiten, welche bereits eine gewisse Gerinnungstendenz haben und zwar relativ um so mehr, je schwächer ausgeprägt dieselbe ist.

Gerade ebenso verhalten sich nun bekanntlich die Leukocyten. Hier aber wissen wir, worum es sich handelt, nämlich um eine Abspaltung des Fibrinfermentes von seinen Mutterstoffen in der Zelle durch das Plasma, beziehungsweise durch die künstlichen Gerinnungsmischungen.

Man wird aber, wenn man diese Vorstellung auf die rothen Blutkörperchen überträgt, nun nicht mehr an das Hämoglobin sondern an das Stroma denken, welches offenbar in näherer Beziehung zur Substanz der Leukocyten steht als das Hämoglobin. Zudem hat Rauchenbach bereits gefunden, daß die Stromata der gekernten Blutkörperchen der Vögel und Amphibien, welche sich vom Hämoglobin leicht trennen lassen, sich in der erwähnten Beziehung ganz wie die Leukocyten verhalten.

Die Aufgabe, die ich mir stellte, war demnach das Hämoglobin und die Stromata nicht blos der gekernten son-

dern auch der kernlosen rothen Blutkörperchen möglichst vollkommen von einander zu trennen, die Stromata zu sammeln und mit ihnen sowohl als mit dem von ihnen gereinigten Hämoglobin die betreffenden Gerinnungsversuche anzustellen.

Behufs dieser Trennung bediente ich mich der bereits von Semmer für das Vogel- und Amphibienblut benutzten Methode. Dieselbe beruht auf der zunächst am Säugethierblut gemachten Beobachtung von Schweiger-Seidel und A. Schmidt, daß die Stromata der rothen Blutkörperchen bei Verdünnung mit kohlenensäurehaltigem, destillirtem Wasser nach Extraction des Hämoglobins nicht aufquellen und daher sichtbar bleiben. Semmer wendete dieses Verfahren auf Vogel- und Amphibienblut an und fand, daß die viel massigeren Stromata dabei unter Austritt des Hämoglobins nicht bloß vollständig erhalten bleiben, sondern daß sie wegen ihrer relativ bedeutenderen Schwere sich auch rasch zu Boden senken; durch wiederholtes Dekantiren mit kohlenensäurehaltigem Wasser können sie dann vollständig gereinigt werden.

Die Stromata des Säugethierblutes aber machen wegen ihres geringen spec. Gewichtes bei der Trennung mehr Mühe. Hier gelangte ich jedoch mit Hülfe der Centrifuge, welche übrigens auch beim Vogelblut in Anwendung kam, zum Ziel. In dem mit kohlenensäurehaltigem Wasser verdünnten Säugethierblut entstand auf der Centrifuge ein zwar sehr lockerer, sich leicht wieder vertheilender, aber scharf abgegrenzter Bodensatz von farblosen Blutkörperchenresten, über welchen eine ganz zellenfreie rothe Flüssigkeit stand, welche abgehoben und zum Ueberflus noch durch mehrfaches Filtrirpapier filtrirt wurde. Der Bodensatz enthielt zwar immer noch aufgelöstes Hämoglobin als Schwemmflüssigkeit, aber wenn er sich als wirksam erwies, die abgehobene und filtrirte

Hämoglobinlösung sich dagegen indifferent verhielt, so konnte jene Wirkung doch eben nur auf die im Bodensatz befindlichen Zellenreste bezogen werden.

Vor der Verdünnung mit kohlensäurehaltigem Wasser machte ich das Blut möglichst serumarm, und zwar das Hühner- und Rinderblut indem ich den betreffenden Blutkuchen nach beendeter Contraction und nach Entfernung des oben abgeschiedenen Serum auspresste, das Pferdeblut indem ich nach dem bekannten, vorhererwähnten Verfahren von A Schmidt zu Werke ging. Diese Blutart wurde natürlich vollständiger vom Serum befreit als das Rinder- und Hühnerblut. Die Verdünnung mit kohlensäurehaltigem Wasser fand statt bald in dem Verhältniß von 1:4, bald in dem von 1:10; andere Verdünnungsgrade kamen nicht zur Anwendung. In Hinsicht der Resultate erwiesen sich die genannten Grade der Verdünnung als qualitativ gleich günstig. Die filtrirte Hämoglobinlösung wurde vor Anstellung des Versuches zur Entfernung der als relatives Gerinnungshinderniß wirkenden Kohlensäure kräftig mit Luft geschüttelt bis sie ganz arterialisirt erschien.

Da doch immer noch ein Rest von Serum und damit zugleich von freiem Ferment bei den Blutkörperchen zurückgeblieben war, so konnte insbesondere mit Bezug auf das Rinder- und Hühnerblut a priori kaum erwartet werden, daß die wässerigen Hämoglobinlösungen sich absolut unwirksam verhalten würden. Diese eventuelle, durch die Verdünnung sehr reducirte Wirkung der Serumreste wäre ohne Bedeutung, da es schließlich doch nur darauf ankam festzustellen, ob die Stromata enthaltende Bodensatz stärker oder schwächer wirkte als die über ihm stehende, zellenfreie Flüssigkeit. Bodensatz und Hämoglobinlösung wurden stets in gleichen Mengen zu den Probestrüßigkeiten hinzugefügt; da die letz-

teren durch diese Zusätze verdünnt wurden, so erhielten die Controlleproben stets einen gleichen Zusatz an destillirtem Wasser.

Das Resultat dieser Versuche war: der Bodensatz wirkte überall durchaus ebenso energisch wie die intacten rothen Blutkörperchen selbst, die Hämoglobininlösung aber blieb entweder ganz ohne Wirkung oder sie kürzte den Gerinnungsproceß nur um sehr wenig ab. Gerade beim Rinder- und Hühnerblut fehlte aber diese unbedeutende, auf den Fermentgehalt der Serumreste zu beziehende Beschleunigung oft ganz, und gerade beim Pferdeblut war sie oft bedeutender, wenn sie auch niemals den Grad erreichte, welcher durch den Zusatz der Zellenreste des Pferdeblutes erreicht wurde. Da nun aber das Pferdeblut durch die vorbereitenden Manipulationen viel ferumärmer gemacht wurde als das Rinder- und Hühnerblut, so kann die verhältnißmäßig bedeutende Wirksamkeit der aus dem ersteren gewonnenen Hämoglobininlösung offenbar nicht auf die Serumreste und ihren Fermentgehalt bezogen werden. Andererseits aber waren in der Hämoglobininlösung vom Pferde keine Zellenreste wahrzunehmen. Es bleibt demnach nur die Annahme übrig, daß ein Theil der Stromata des Pferdeblutes im Unterschiede von denjenigen des Rinder- und Hühnerblutes doch bis zur Unsichtbarkeit aufgequollen war ¹⁾ und deshalb auch nicht durch die Centrifuge abgechieden werden konnte, oder daß das kohlenäurehaltige Wasser den Pferdeblutkörperchen nicht bloß das Hämoglobin sondern auch einen Theil der Mutterstoffe des Fibrinfermentes entzogen hatte.

1) Diese Annahme widerspricht aber der bekannten Erfahrung, daß das Pferdeblut, um lackfarben zu werden, grösserer Wasserzusätze bedarf als das Rinderblut.

Ich habe mich mit dem Versuche diese Alternation zu entscheiden, was vielleicht nicht so schwer gewesen wäre nicht befaßt und bemerke nur noch, daß es sich aus diesen Erfahrungen erklärt, warum A. Schmidt seine aus Pferdeblut gewonnenen Hämoglobinlösungen, bei deren Herstellung die Centrifuge nicht in Anwendung kam und bei welchen außerdem der Vergleich mit den viel stärker wirkenden Zellenresten fehlte, immer noch in Gerinnungsmischungen wirksam fand.

Der aus meinen Versuchen sich ergebende Schluss ist also: nicht das Hämoglobin sondern das Stroma der rothen Blutkörperchen wirkt beschleunigend auf die Gerinnung und zwar nicht weil eine Potenzirung der Wirksamkeit des gegebenen Fermentvorrathes stattfindet, sondern weil dieser einen Zuwachs erfährt durch Spaltungsvorgänge welche durch die betreffenden Flüssigkeiten ebenfalls in dem Stroma der rothen Blutkörperchen wie in der Substanz der farblosen Blutkörperchen eingeleitet wird. Daß die rothen Blutkörperchen trotz ihrer relativen Stromaarmuth so außerordentlich energisch wirken liegt an ihrer großen Anzahl. Bringt man entsprechende Mengen von Lymphdrüsenzellen oder mittelst der Centrifuge gesammelter Zellen aus proplastischen Flüssigkeiten in Blutplasma oder in künstliche Gerinnungsmischungen, so ist der Effect durchaus kein geringerer. Die von A. Schmidt beobachtete Unwirksamkeit krystallisirten Hämoglobins beruht auf der Beseitigung der Zellenreste durch die KrySTALLISATION; ihnen sind auch die Thrombosen zuzuschreiben, welche Sachsensdahl und Bojanus durch Injectionen wässriger Lösungen des den Versuchsthieren selbst entnommenen Blutes, ja bloß durch größere Wasserinjectionen erzeugten, während die Injection concentrirter (10—12%) Lösungen krySTALLINISCHEN Hämoglobins ohne Wirkung blieb.

Beispielswegen stelle ich in den nachfolgenden Tabellen die Resultate von ein Paar meiner Versuche, deren Anzahl eine viel gröfsere ist, zusammen. Ich habe gerade eine solche Versuchsreihe ausgewählt, in welcher die aus dem Pferdeblut hergestellte Hämoglobinlösung sich noch deutlich wirksam erwies, wiederhole aber, dafs es auch Fälle gab, in welchen diese Wirkung auch hier nahezu Null war und dafs beim Rinder- und Hühnerblut Null die Regel und ein wenig mehr als Null die Ausnahme war.

Die Zahlen in der Tabelle geben die in Minuten ausgedrückten Gerinnungszeiten an. Der Zusatz an Zellenresten, Hämoglobinlösung und Wasser (letzteres für die Controlleprobe) betrug 0,2 Ccm. pro 2 Ccm. Reactionsflüssigkeit. Die Reactionsflüssigkeiten bestanden in filtrirtem Pferdeblutplasma, in 1 %-igem aus demselben Material dargestellten Gallensalzplasma und in einer aus gleichen Theilen Rinderferum und Pericardialflüssigkeit vom Pferde dargestellten künstlichen Gerinnungsmischung. Jeder der drei horizontalen Tabellenstäbe bezieht sich auf einen besonderen mit einer besonderen Reactionsflüssigkeit angestellten Versuch. Die Ueberschriften H und H₁, St und St₁ am Kopf der einzelnen verticalen Tabellenstäbe bedeuten Hämoglobin resp. Stroma in 10-facher und in 4-facher Verdünnung.

		aus Pferdeblut				aus Rinderblut			
Reactionsflüssigkeit	Controlle	H	H ₁	St	St ₁	H	H ₁	St	St ₁
Filtrirtes Plasma	104	67	67	37	24	104	104	19	14
Gallensalzplasma	306	278	272	157	94	302	305	76	24
Künstl Gerinnungs- mischung	53	51	50	44	40	53	53	41	32

Wie man sieht, beitätigt sich das über das Hämoglobin und die Zellenreste Gefagte in dieser Tabelle; ebenso

sieht man den Unterschied zwischen den Hämoglobinlösungen vom Pferde- und vom Rinderblut. In Petreff der Zellenreste sieht man, daß dieselben nach 10-facher Verdünnung durchwegs weniger wirksam sind als nach 4-facher.

Die folgende Tabelle bezieht sich auf Hühnerblut

Reactionsflüssigkeit	Controlle	H	H ₁	St	St ₁
Künstl. Gerinnungsmischung	165	165	165	18	27

In diesem Falle hatten gerade die aus der verdünnteren Blutlösung gewonnenen Zellenreste stärker gewirkt, was aber wie ich ausdrücklich bemerke, durchaus nicht die Regel war.

In mehreren Fällen habe ich die gekennten Blutkörperchen gekühlten Pferdeblutes vor Eintritt der Gerinnung mit kohlensäurehaltigen Wasser verdünnt und dann die Stromata auf der Centrifuge gesammelt. In der verdünnten Flüssigkeit trat nachträglich keine Gerinnung ein, auch nicht nach Entfernung der Kohlensäure; offenbar lag dieses daran, daß die verdünnte Flüssigkeit eben nur noch höchst geringe Mengen von Plasma enthielt. Die Wirkungen der Zellenreste aber und die der Hämoglobinlösung waren ganz dieselben wie in den erwähnten Versuchen. Die Stromata der rothen Blutkörperchen enthalten also die Mutterstoffe des Fibrinfermentes ebenso wohl vor als nach Eintritt der normalen Blutgerinnung.

Beiläufig erwähne ich noch einen Versuch, in welchem ich nach der bekannten Methode mit Salzplasma den Zuwachs an Fibrinferment ermittelte, welcher durch einen die Gerinnung beschleunigenden Zusatz an Rinderblutkörperchen zu nicht filtrirtem Pferdeblutplasma entstanden war. Ich erhielt für das reine Plasma 1,4 und für das mit Zellenresten versetzte 2,4 Fermenteinheiten. Es hat hier also eine tatsächliche Mehrentwicklung von Fibrinferment stattgefunden.

Es erhebt sich nun die Frage: betheiligen sich die

rothen Blutkörperchen auch an dem normalen Gerinnungsvorgange des Blutes und, wenn dies der Fall ist, geht ein Theil derselben dabei zu Grunde oder geben sie nur gewisse wirkfame Bestandtheile an die Blutflüssigkeit ab? Heyl hat zwar gefunden, daß nach dem Defibriniren des Blutes mittelst Schlagen die Zahl der rothen Blutkörperchen um ein sehr Geringes abnimmt, aber hierbei könnte es sich doch nur um eine einfache mechanische Einfachleisung durch den Faserstoff handeln. Die Antwort auf diese Frage muß späteren Untersuchungen überlassen bleiben.

Noch eine weitere Frage will ich hier berühren, ohne sie sicher beantworten zu können. Aus meinen Versuchen geht nämlich hervor, daß die Abspaltung des Fibrinfermentes von der Substanz der Leukocyten, der Stromata der rothen Blutkörperchen und von den Producten der regressiven Metamorphose der Eiweißkörper nur bewirkt werden kann durch Flüssigkeiten, welche bereits eine gewisse Neigung zur Faserstoffgerinnung haben, so daß sie auch an und für sich in kürzerer oder längerer Zeit gerinnen würden. Wo aber diese Neigung vorhanden ist, da findet sich auch immer das freie Fibrinferment, wenn auch nur in Spuren, denn solche Spuren präexistiren, wie wir wissen, schon im Organismus, und wo das Fibrinferment vorkommt, da giebt es auch, wegen des Ineinandergreifens der verschiedenen Gerinnungsstadien, eine wenn auch noch so langsame Fermentation. Wenn wir den Sachverhalt nun dadurch ausdrücken, daß wir sagen, das Fibrinferment kann von seinen Mutterstoffen abgespalten werden nur durch Flüssigkeiten, welche bereits freies Ferment enthalten, beziehungsweise in welchen die Fermentation bereits begonnen hat, so fragt es sich: wo liegt der Anfang dieser Mitte? woher stammt das erste freie Fermentmolekül? Wir werden hiermit auf die Vorgänge im Or-

ganismus hingewiesen, wo es manche Einwirkungen geben mag, die ausserhalb des Körpers wegfallen. Vielleicht ist aber auch der Fermentgehalt der mit einer gewissen Gerinnungstendenz versehenen Flüssigkeiten und die mit diesem Gehalt zusammenhängende Fermentation zwar eine regelmässige und nothwendige Folge jener Tendenz, während doch die Fähigkeit solcher Flüssigkeiten das Fibrinferment von seinen Mutterstoffen abzuspalten auf anderen Eigenschaften derselben Flüssigkeiten beruht, so dass ihr Fermentgehalt und die durch denselben bedingte Fermentation für diese Fähigkeit gleichgültig sind. Demnach würde in den betreffenden Flüssigkeiten sich noch ein unbekanntes Etwas befinden, welches die Spaltungen bewirkt, also vor dem freien Ferment liegt, so dass nur thatsächlich jede Flüssigkeit, welche spaltend wirkt zugleich auch immer freies Ferment enthält.

Thesen.

1. Das Hämoglobin ist bei der Faserstoffgerinnung nicht betheiligt.
 2. Die Vitalität der Zelle schützt den Magen vor der Selbstverdauung.
 3. Der Sommerbrodt'sche Sphygmograph giebt allein zuverlässige Resultate.
 4. Der stumpfe Haken muß aus dem geburtshilflichen Besteck verbannt werden.
 5. Das Geschlecht des Fötus ist im Ovulum präformirt.
 6. Der Unterschied der Curarewirkung bei der Application per os und subcutan beruht auf der Zurückhaltung des Giftes in der Leber.
-

